

# Ultralydsvejledt undersøgelse af æggeledeerne

---

## Hvad er formålet med undersøgelsen?

- at undersøge om der er passage i dine æggeledeere.

Sædcellerne skal kunne passere ud i æggeledeerne, og det befrugtede æg transporteres tilbage til livmoderen.

- at skylle æggeledeerne igennem så "løse forhindringer" fjernes, hvorved passageforholdene bedres, evt. normaliseres.

## Hvad kan undersøgelsen bruges til?

Til at vælge den korrekte behandling. Undersøgelsen i sig selv kan bedre chancen for graviditet for nogle kvinder. Er der ingen passage ved undersøgelsen, kan vi henvise videre til sygehuset, som kan afklare dette ved en kikkert-operationsundersøgelse (THL/laparoskopi).

Er æggeledeerne aflukkede, er det formålsløst at udføre inseminationsbehandling. Man må da overveje ægtransplantation (IVF).

## Hvornår er det bedste tidspunkt for undersøgelsen?

Efter menstruationen og før ægløsningstidspunktet hvor der ikke er risiko for graviditet.

**Hvordan udføres undersøgelsen?** Der kræves ingen forberedelse ud over en negativ klamydiatest. I gynækologisk leje foretages steril afvaskning af skeden. Herefter indføres et tyndt og blødt plastikrør (kateter) gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen.

Ultralydsundersøgelsen foregår gennem skeden. Mens lægen foretager undersøgelsen, sprøjter sygeplejersken kontrastgel, 1-10 ml igennem kateteret. Kontrasten løber ud igennem æggeledeerne. Gennemskyllningen kan være forbundet med let ubehag.

Undersøgelsen varer 5 – 10 minutter.

## Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

Du får umiddelbart i forbindelse med undersøgelsen resultatet at vide. Den videre behandling planlægges straks.

**Hvis der er fri passage** er begge æggeledeere åbne. På skærmen ses gennemstrømning af æggeledeerne med væskeophobning bag livmoderen. Indsprøjtningen vil foregå under lavt tryk.

**Hvis der er nedsat passage** ved en lukket æggeleder eller forsnævrede æggeledeere, er der let udvidelse af livmoderhulen, langsom gennemstrømning, og indsprøjtningen vil foregå under forhøjet tryk.

**Hvis der ingen passage kan opnås**, tyder det på, at begge æggeledeere er lukkede. Forsøg på gennemskyllning vil udvide livmoderhulen og give smerter.

**Gør det ondt?** Der kan være smerter ved undersøgelsen. Det kan være med fordel at tage 1 g Panodil 1 time inden undersøgelsen.

**Er der risiko for infektion?** Ved indføring af instrumenter i livmoderen er der altid en lille infektionsrisiko, men den skønnes at være mindre end én procent. Symptomer på infektion kan være smerter, feber eller ildelugtende udflåd. Klinikken kontaktes.

## Kan jeg gå på arbejde bagefter?

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af afvasknings- og gennemskyllningsmidlet kan løbe ud af skede. Du vil få tilbudt et hygiejnebind.

Man kan gå direkte på arbejde efter undersøgelsen.

**Hvad med sexlivet?** Du kan have normalt samliv før og efter undersøgelsen.