

Medicinsk udskrabning

Du skal idag have medicinsk behandling for at tømme livmoderhulen. Dette gør man typisk i forbindelse med en tilgrundegået graviditet.

Hvis du ikke i forvejen er begyndt at bløde, får du en tablet (Mifegyne) som blødgør din livmoderhals.

Dagen efter får du oplagt 4 stikpiller (Cytotec) i skeden, som får din livmoder til at trække sig sammen. Eventuelt vil du selv kunne lægge dem op derhjemme. Du skal ligge i sengen 1 – 1,5 time efter.

Du vil samtidig få smertestillende tabletter udleveret, som vi anbefaler, at du tager hver 6. time det første døgn.

Du kan forvente blødning fra skeden 2 til 4 timer efter, at stikpillerne er lagt op. Blødningen vil de første timer være kraftig/klumpet, men det er forskelligt fra kvinde til kvinde hvor meget man bløder.

Ved voldsom blødning eller smerter skal du, uden for vores åbningstid, kontakte vagtlægen. Af samme grund anbefaler vi, at du er sammen med en anden voksen under forløbet, eller alternativt har aftale med en, der vil kunne komme hurtigt. Det er vigtigt, at du får noget at drikke og spise i løbet af dagen.

Lægevagtens tlf nr er **70113131**

Behandlingen afsluttes altid med en kontrolskanning

Da medicinens betydning for en eventuel ny graviditet ikke er helt afklaret, anbefaler vi, at I først forsøger igen en måned efter behandlingen.

Vi henviser til hjemmesiden minmedicin.dk/indlægssedler for yderligere information om virkning/bivirkning af udleveret medicin.

Speciallæge Anni Rosgaard
Sygeplejerske Irene Krabbe
Tlf : 61694802 (klinik-mobil)