

Medicinsk abort vejledning

Efter undersøgelsen kan vi se, at din graviditet svarer til uge:

Du har taget beslutningen om at afslutte din graviditet med en medicinsk abort.

Behandlingen består af to dele:

- 1 tablet Mifegyne, der stopper graviditeten. Denne tablet har vi aftalt, at du tager:
- Stikpiller Cytotec, som får livmoderen til at trække sig sammen, således at blødningen starter og graviditetsvævet kvitteres. Vi har aftalt, at du lægger stikpillerne op:

Sådan gør du:

- Stikpillerne lægges op i skeden. Som udgangspunkt vil det være om morgenen, men andet kan aftales med sygeplejersken. Du skal ligge under dynen 1½ time efter, du har lagt stikpillerne op.
- Inden, du lægger stikpillerne op, skal du tage 2 tablet Pamol/Panodil 500 mg og 2 tablet Ipren 200 mg samt spise morgenmad. Den smertestillende behandling, kan du tage op til 4 gange på en dag. Det er almindeligt at have behov for smertestillende i 1-3 dage.
- Det tager normalt 4-6 timer, før blødningen starter, der er aftalt telefonisk opfølgning med klinikken:
Du er medgivet 2 ekstra Cytotec, som du kan oplægge efter aftale.
- Du får udleveret 1 stærkere smertestillende tablet (Kodein), som du kan tage, hvis du får brug for det.

Klinikmobil nr. ved spørgsmål: 61694802.

Efter kl. 16.00 skal du bruge vagtlægen.

Vi vil gerne se dig til kontrol ca. 1 uge efter behandlingen.

Vi har aftalt tid:

Vi henviser til hjemmesiden www.minmedicin.dk/indlaegssedler for yderligere information om virkning/bivirkning af udleveret medicin, end den der er givet under konsultationen.

Dokument 101, udarbejdet af Irene Krabbe, godkendt af speciallæge Anni Rosgaard maj 2013, revideret 2018, revideret feb. 2021, revideret jan. og august 2024